Bijection

Bijection	1
1. Qu'est qu'une bijection ?.....	2
2. Bijection réciproque	5
3. Courbe représentative de la bijection réciproque	7
4. Bijection et variation	10
5. THÉORÈME DE LA BIJECTION.....	13
6. Propriété « dérivabilité implique continuité »	16

1. Qu'est qu'une bijection ?

Définition

f est une bijection de A sur B ssi
 f une fonction de A dans B
 { tout élément de B possède un et un seul antécédent par f

Exercice 1

Les fonctions suivantes sont des fonctions de A dans B .
 Sont-elles des bijections de A sur B ?
 Si non, pourquoi?

(e) $f: [0; +\infty[\rightarrow [0; +\infty[: x \mapsto x^2$
 $A = B = [0; +\infty[$

Résolution de l'exercice 1

a) C'est une fonction de A dans B .

Ce n'est pas une bijection de A sur B car 8 n'a pas d'antécédent.

b) C'est une fonction de A dans B .

Ce n'est pas une bijection de A sur B car 5 a deux antécédents (7 et 9).

c) C'est une fonction de A dans B .

C'est une bijection de A sur B .

d) C'est une fonction de A dans B .

Ce n'est pas une bijection de A sur B car 4 a deux antécédents (-2 et 2).

Remarque :

Ce n'est pas une bijection car :

- 4 a deux antécédents (-2 et 2)
- 9 a deux antécédents (-3 et 3)
- ...
- -1 n'a pas d'antécédent
- $-\pi$ n'a pas d'antécédent
- ...

Il y a donc une infinité de raisons qui justifient que ce n'est pas une bijection. Néanmoins, une seule raison suffit pour ne pas en faire une bijection.

e) C'est une fonction de A dans B .

C'est une bijection de A sur B .

Exercice 2

Les fonctions suivantes sont des fonctions de A dans B .
Sont-elles des bijections de A sur B ?
Si non, pourquoi?

(d) $f: \left[\frac{-\pi}{2}; \frac{\pi}{2}\right] \rightarrow [-1; 1] : x \mapsto \sin(x)$

$A = \left[\frac{-\pi}{2}; \frac{\pi}{2}\right]$

$B = [-1; 1]$

(e) $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} : x \mapsto \sin(x)$
 $A = \mathbb{R}$
 $B = \mathbb{R}$

2. Bijection réciproque

Propriété

Soit f une bijection de A sur B .

Alors il existe une unique fonction g , appelée bijection réciproque de f , tel que :

- ❖ g est une bijection de B sur A .
- ❖ Pour tout $y \in B$, $g(y) = x$ où x est l'unique antécédent de y par f .

Preuve

Soit la fonction $g: B \rightarrow A$ telle que pour tout y dans B ,

$g(y) = x$ où x est l'unique antécédent de y par f .

➤ Soit $x \in A$.

Il existe un $y \in B$ tel que $f(x) = y$.

x est l'unique antécédent de ce y par f .

x est l'image de ce y par g .

Ce y est un antécédent de x par g .

x possède au moins un antécédent par g .

➤ Soit $x \in A$.

Supposons que $g(y) = x$ et $g(y') = x$.

x est l'antécédent de y par f et x est l'antécédent de y' par f .

Comme f est une fonction, x a une seule image et donc $y = y'$.

x possède au maximum un antécédent par g .

➤ Comme tout x de A possède un et un seul antécédent par g , g est une bijection de B sur A .

• Supposons que h est une autre bijection de B sur A tel que pour tout $y \in B$,

$h(y) = x$ où x est l'unique antécédent de y par f .

Pour tout $y \in B$: $g(y) = x$ où x est l'unique antécédent de y par f

$h(y) = x$ où x est l'unique antécédent de y par f

$g(y) = h(y)$.

La fonction g est donc égale à la fonction h .

La fonction g est donc unique.

c.q.f.d.

Exercice 3

Donner la bijection réciproque de la fonction suivante qui va de A dans B .

Résolution de l'exercice 3

Exercice 4

Donner la bijection réciproque de la fonction suivante qui va de A dans B .

3. Courbe représentative de la bijection réciproque

Propriété

Soit f une bijection de $A \subseteq \mathbb{R}$ sur $B \subseteq \mathbb{R}$ et g la bijection réciproque de f .

Alors, dans un repère orthonormal, les courbes $(\mathcal{C}_f)$ et $(\mathcal{C}_g)$ sont symétriques par rapport à la droite d'équation $y = x$.

Preuve

Mettons-nous dans un repère orthonormal.

Soit un point $A(x; y)$.

Calculons les coordonnées du point A''' , l'image du point A par s , la symétrie axiale dont l'axe est la droite d'équation $y = x$.

Cette symétrie axiale s revient à faire :

- ❖ une rotation de centre O et d'angle $\frac{-\pi}{4}$, son équation complexe est $z' = e^{i\frac{-\pi}{4}}z$
- ❖ suivie d'une symétrie axiale dont l'axe est l'axe des abscisses, son équation complexe est $z'' = \overline{z'}$
- ❖ suivie d'une rotation de centre O et d'angle $\frac{\pi}{4}$, son équation complexe est $z''' = e^{i\frac{\pi}{4}}z''$.

$$z_A = x + iy$$

$$z_{A'} = e^{i\frac{-\pi}{4}}(x + iy) = \left(\frac{\sqrt{2}}{2} - \frac{\sqrt{2}}{2}i\right)(x + iy) = \frac{\sqrt{2}}{2}x + \frac{\sqrt{2}}{2}iy - \frac{\sqrt{2}}{2}ix + \frac{\sqrt{2}}{2}y$$

$$z_{A''} = \frac{\sqrt{2}}{2}x - \frac{\sqrt{2}}{2}iy + \frac{\sqrt{2}}{2}ix + \frac{\sqrt{2}}{2}y$$

$$z_{A'''} = e^{i\frac{\pi}{4}}z_{A''} = \left(\frac{\sqrt{2}}{2} + \frac{\sqrt{2}}{2}i\right)z_{A''}$$

$$z_{A'''} = \frac{2}{4}x - \frac{2}{4}iy + \frac{2}{4}ix + \frac{2}{4}y + \frac{2}{4}ix + \frac{2}{4}y - \frac{2}{4}x + \frac{2}{4}iy = y + ix$$

$$A''' \left(\begin{matrix} y \\ x \end{matrix}\right).$$

Soit $B \in (\mathcal{C}_f)$ alors $B(a; f(a))$ pour un réel a

$B'''(f(a); a)$ est l'image du point B par symétrie axiale s

$$g(f(a)) = a$$

$$B''' \in (\mathcal{C}_g).$$

Donc, l'image d'un point de la courbe $(\mathcal{C}_f)$ par la symétrie axiale s est un point de la courbe $(\mathcal{C}_g)$.

Soit $B \in (\mathcal{C}_g)$ alors $B(a; g(a))$ pour un réel a

$B'''(g(a); a)$ est l'image du point B par symétrie axiale s

$$f(g(a)) = a$$

$$B''' \in (\mathcal{C}_f).$$

Donc, l'image d'un point de la courbe $(\mathcal{C}_g)$ par la symétrie axiale s est un point de la courbe $(\mathcal{C}_f)$.

Par conséquent, les courbes $(\mathcal{C}_f)$ et $(\mathcal{C}_g)$ sont symétriques par rapport à la droite d'équation $y = x$.

c.q.f.d.

Exercice 5

Soit la fonction $f: [0; +\infty[\rightarrow [0; +\infty[: x \mapsto x^2$.

f est une bijection de $[0; +\infty[$ sur $[0; +\infty[$.

Donner la fonction réciproque g de la fonction f .

Dans un repère orthonormal $(O; \vec{i}, \vec{j})$ d'unité graphique 2 cm, tracer les courbes (C_f) et (C_g) et la droite d'équation $y = x$ qui est l'axe de symétrie de la symétrie axiale qui applique (C_f) sur (C_g) .

Résolution de l'exercice 5

$$f: [0; +\infty[\rightarrow [0; +\infty[: x \mapsto x^2$$
$$g: [0; +\infty[\rightarrow [0; +\infty[: x \mapsto \sqrt{x}$$

Exercice 6

Soit la fonction $f: \mathbb{R} \rightarrow]0; +\infty[: x \mapsto e^x$.

f est une bijection de $\mathbb{R}$ sur $]0; +\infty[$.

Donner la fonction réciproque g de la fonction f .

Dans un repère orthonormal $(O; \vec{i}, \vec{j})$ d'unité graphique 2 cm , tracer les courbes (C_f) et (C_g) et la droite d'équation $y = x$ qui est l'axe de symétrie de la symétrie axiale qui applique (C_f) sur (C_g) .

Aide : pensez à un mot de deux lettres commençant par l et finissant par n.

4. Bijection et variation

Propriété

- 1) Si f est une fonction strictement croissante sur A ,
alors la restriction de f à A est une bijection de A sur l'image de A par f .
- 2) Si f est une fonction strictement décroissante sur A ,
alors la restriction de f à A est une bijection de A sur l'image de A par f .

Preuve

- 1) Soit f une fonction strictement croissante sur A .

Soit g la restriction de f à A .

Notons l'ensemble B l'image de l'ensemble A par f .

La fonction g est une fonction qui va de A sur B , c'est à dire que chaque élément de B possède un antécédent.

Montrons que cet antécédent est unique.

Soit un y appartenant à B .

Supposons que y a deux antécédents différents x_1 et x_2 .

Supposons que $x_1 < x_2$.

On a donc $g(x_1) = g(x_2) = y$.

Comme f est strictement croissante sur A , g est aussi strictement croissante sur A .

Donc, $g(x_1) < g(x_2)$; $g(x_1) \neq g(x_2)$.

On a aussi $g(x_1) \neq g(x_2)$ si on suppose que $x_1 > x_2$.

On a donc une contradiction, et donc y a un et un seul antécédent.

g est une bijection de A sur B .

- 2) La preuve est similaire.

c.q.f.d.

Exercice 7

- a) Dans un repère orthonormal, tracer, entre $x = -4$ et $x = 4$, la courbe de la fonction $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}: x \mapsto x^2$.
- b) Déterminer l'image de l'ensemble $E = [2; 3]$ par la fonction f .
Donner la restriction de la fonction f à E . Est-ce une bijection ?
- c) Déterminer l'image de l'ensemble $H = [-3; -2]$ par la fonction f .
Donner la restriction de la fonction f à H . Est-ce une bijection ?
- d) Déterminer l'image de l'ensemble $E \cup H = [-3; -2] \cup [2; 3]$ par la fonction f .
Donner la restriction de la fonction f à $E \cup H$. Est-ce une bijection ?

Résolution de l'exercice 7

•

- $f[E] = [4; 9]$
 $f \upharpoonright E: [2; 3] \rightarrow [4; 9]: x \mapsto x^2$
C'est une bijection.
- $f[H] = [4; 9]$
 $f \upharpoonright H: [-3; -2] \rightarrow [4; 9]: x \mapsto x^2$
C'est une bijection.
- $f[E \cup H] = [4; 9]$
 $f \upharpoonright E \cup H: [-3; -2] \cup [2; 3] \rightarrow [4; 9]: x \mapsto x^2$
Ce n'est pas une bijection car 9 a deux antécédents : -3 et 3 .

Remarque :

On a utilisé ici :

- $f \upharpoonright E$ pour la restriction de la fonction f à E
- $f[E]$ l'image de l'ensemble E par la fonction f .

D'autres notations sont possibles.

Exercice 8

- a) Dans un repère orthonormal $(O; \vec{i}, \vec{j})$ d'unité graphique 1 cm, tracer, entre $x = -2$ et $x = 6$, la courbe de la fonction

$$f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}: x \mapsto |x - 2| + 3.$$

Aide :

- Partez de la courbe de $x \mapsto |x|$.
 - Une translation de vecteur $2\vec{i}$ vous donnera la courbe de $x \mapsto |x - 2|$.
 - Une autre translation de vecteur $3\vec{j}$ vous donnera la courbe de $x \mapsto |x - 2| + 3$.
 - Donc la courbe de $x \mapsto |x - 2| + 3$ est juste la courbe de $x \mapsto |x|$ qui a subi une translation de vecteur $2\vec{i} + 3\vec{j}$.
- b) Déterminer l'image de l'ensemble $E = [3; 5]$ par la fonction f .
Donner la restriction de la fonction f à E . Est-ce une bijection ?
- c) Déterminer l'image de l'ensemble $H = [0; 2]$ par la fonction f .
Donner la restriction de la fonction f à H . Est-ce une bijection ?
- d) Déterminer l'image de l'ensemble $E \cup H = [0; 2] \cup [3; 5]$ par la fonction f .
Donner la restriction de la fonction f à $E \cup H$. Est-ce une bijection ?

5. THÉORÈME DE LA BIJECTION

Théorème des valeurs intermédiaires

Si a et b sont deux réels tels que $a < b$
 f est une fonction dans les réels
 f est une fonction continue sur l'intervalle $[a; b]$,

alors

- i. CAS où $f(a) < f(b)$:
pour tout $k \in [f(a); f(b)]$, il existe un réel $\alpha \in [a; b]$ tel que $f(\alpha) = k$.
- ii. CAS où $f(a) = f(b)$: il existe un réel $\alpha \in [a; b]$ tel que $f(\alpha) = f(a)$.
- iii. CAS où $f(a) > f(b)$:
pour tout $k \in [f(b); f(a)]$, il existe un réel $\alpha \in [a; b]$ tel que $f(\alpha) = k$.

Démonstration

Le cas ii est trivial et le cas iii se démontre de la même manière que le cas i.

Démontrons le cas i en utilisant la méthode de dichotomie :

Soient les suites (a_n) :
$$\begin{cases} a_0 = a \\ a_{n+1} = a_n & \text{si } f\left(\frac{a_n+b_n}{2}\right) \geq k \\ a_{n+1} = \frac{a_n+b_n}{2} & \text{si } f\left(\frac{a_n+b_n}{2}\right) < k \end{cases}$$
 et (b_n) :
$$\begin{cases} b_0 = b \\ b_{n+1} = \frac{a_n+b_n}{2} & \text{si } f\left(\frac{a_n+b_n}{2}\right) \geq k \\ b_{n+1} = b_n & \text{si } f\left(\frac{a_n+b_n}{2}\right) < k \end{cases} .$$

Par récurrence, pour tout entier naturel n , $a \leq a_n \leq b_n \leq b$.

Ce résultat ci-dessus est à utiliser pour prouver les deux preuves par récurrences suivantes.

Par récurrence, la suite (a_n) est croissante.

Par récurrence, la suite (b_n) est décroissante.

Comme $b_{n+1} - a_{n+1} = \frac{b_n - a_n}{2}$ et $b_0 - a_0 = b - a$, la suite $(b_n - a_n)$ est géométrique de raison $\frac{1}{2}$ et de premier terme $b - a$, d'où $b_n - a_n = (b - a) \left(\frac{1}{2}\right)^n$, et par conséquent :

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} b_n - a_n = 0 .$$

Les suites (a_n) et (b_n) sont donc adjacentes et convergent donc vers la même limite l avec $a_n \leq l \leq b_n$.

Comme f est continue en l ,

$$\lim_{x \rightarrow l} f(x) = f(l) .$$

Par composition, on a :

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} f(a_n) = f(l) \text{ et } \lim_{n \rightarrow +\infty} f(b_n) = f(l) .$$

Par récurrence, on a $f(a_n) \leq k \leq f(b_n)$.

Par le théorème des gendarmes, on a :

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} k = f(l)$$

et donc, $k = f(l)$.

Il existe donc bien un réel $\alpha \in [a; b]$ tel que $f(\alpha) = k$.

Il suffit de prendre $\alpha = l$.

c.q.f.d.

Théorème de la bijection

Si a et b sont deux réels tels que $a < b$
 f est une fonction dans les réels
 f est une fonction continue sur l'intervalle $[a; b]$
 f est strictement croissante (resp. décroissante) sur $[a; b]$
 $f(a) < f(b)$ (resp. $f(a) > f(b)$),
alors pour tout $k \in [f(a); f(b)]$ (resp. $[f(b); f(a)]$),
il existe un unique réel $\alpha \in [a; b]$ tel que $f(\alpha) = k$.

Démonstration

Supposons que la fonction f est strictement croissante.

Soit un réel $k \in [f(a); f(b)]$.

Par le théorème des valeurs intermédiaires, il existe un réel α appartenant à l'intervalle $[a; b]$ tel que $f(\alpha) = k$.

Soit α_1 un réel appartenant à l'intervalle $[a; b]$ tel que $f(\alpha_1) = k$.

Soit α_2 un réel appartenant à l'intervalle $[a; b]$ tel que $f(\alpha_2) = k$.

Supposons que $\alpha_1 \neq \alpha_2$.

Comme $f(\alpha_1) = k$ et $f(\alpha_2) = k$, on a $f(\alpha_1) = f(\alpha_2)$.

Mais f est strictement croissante alors soit $f(\alpha_1) < f(\alpha_2)$ ou $f(\alpha_2) < f(\alpha_1)$ d'où $f(\alpha_1) \neq f(\alpha_2)$.

On a une contradiction.

Donc, $\alpha_1 = \alpha_2$.

Par conséquent, il existe un unique réel $\alpha \in [a; b]$ tel que $f(\alpha) = k$.

Le cas où la fonction f est strictement décroissante se traite de la même manière.

c.q.f.d.

Exercice 9

Déterminer le nombre de solutions de l'équation $x^3 - 3x + 1 = 0$, et un encadrement d'amplitude 10^{-2} de chacune de ces solutions par la méthode du balayage.

Exercice 10

Déterminer le nombre de solution de l'équation $-2x^3 - 3x^2 + 36x - 35 = 10$, et un encadrement d'amplitude 10^{-3} de chacune des solutions par la méthode du balayage.

Exercice 11

Déterminer le nombre de solutions de l'équation $2x^3 - 9x^2 - 24x + 1 = 0$, et un encadrement d'amplitude 10^{-2} de chacune de ses solutions par la méthode du balayage.

Exercice 12

Déterminer le nombre de solution de l'équation $-x^3 - 6x^2 + 36x - 30 = 12$, et un encadrement d'amplitude 10^{-3} de chacune ses solutions par la méthode du balayage.

Solutions des exercices 9 à 12

1) L'équation $x^3 - 3x + 1 = 0$ admet exactement 3 solutions α_1 , α_2 et α_3 telles que :

$$\alpha_1 \in [-1,88 ; -1,87]$$

$$\alpha_2 \in [0,34 ; 0,35]$$

$$\alpha_3 \in [1,53 ; 1,54] .$$

2) L'équation $-2x^3 - 3x^2 + 36x - 35 = 10$ admet une et une seule solution α telle que :

$$-5,509 \leq \alpha \leq -5,508 .$$

3) Il y a 3 et seulement 3 solutions α_1 , α_2 et α_3 telles que :

$$-1,92 \leq \alpha_1 \leq -1,91$$

$$0,04 \leq \alpha_2 \leq 0,05$$

$$6,37 \leq \alpha_3 \leq 6,38 .$$

4) Il y a exactement une solution α telle que :

$$\alpha \in [-10,014 ; -10,013] .$$

6. Propriété « dérivabilité implique continuité »

Propriété

Si la fonction f est dérivable sur l'intervalle I non nul alors elle est continue sur cet intervalle.

Démonstration

Soit $a \in I$.

Pour tout $x \in I$ et différent de a :

$$\begin{aligned}\frac{f(x)-f(a)}{x-a} &= \frac{f(x)-f(a)}{x-a} \\ f(x) - f(a) &= \frac{f(x)-f(a)}{x-a} (x-a) \\ f(x) &= \frac{f(x)-f(a)}{x-a} (x-a) + f(a).\end{aligned}$$

Posons $g(x) = f(x)$ pour tout $x \in I$ et différent de a .

On a :

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - f(a)}{x - a} = f'(a) \in \mathbb{R} \text{ car } f \text{ est dérivable sur } I \quad (1)$$

$$\lim_{x \rightarrow a} (x - a) = 0 \quad (2)$$

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - f(a)}{x - a} (x - a) = 0 \quad (3) \text{ grâce à (1) et (2)}$$

$$\lim_{x \rightarrow a} f(a) = f(a) \quad (4)$$

$$\lim_{x \rightarrow a} g(x) = f(a) \quad \text{grâce à (3) et (4).}$$

On a donc

$$\lim_{\substack{x \rightarrow a \\ x \neq a}} f(x) = f(a)$$

d'où

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = f(a)$$

f est continue en a .

c.q.f.d.

Remarque

Intuitivement une fonction dans $\mathbb{R}$ est continue si sa courbe peut être tracée sans lever la main.

Remarque

La réciproque de cette propriété n'est pas vraie.

En effet, la fonction valeur absolue est continue sur $\mathbb{R}$ mais elle n'est pas dérivable sur $\mathbb{R}$ (elle est dérivable partout sauf en 0).

Prouvons que la fonction valeur absolue est continue sur $\mathbb{R}$.

$$|x| = \begin{cases} x & \text{si } x \geq 0 \\ -x & \text{si } x < 0 \end{cases}$$

La fonction $x \mapsto x$ est continue sur $]0; +\infty[$ et donc la fonction $x \mapsto |x|$ est continue sur $]0; +\infty[$.

La fonction $x \mapsto -x$ est continue sur $]-\infty; 0[$ et donc la fonction $x \mapsto |x|$ est continue sur $]-\infty; 0[$.

On a :

$$\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ x < 0}} |x| = \lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ x < 0}} -x = 0 = |0| \quad (1)$$

$$\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ x > 0}} |x| = \lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ x > 0}} x = 0 = |0| \quad (2)$$

$$|0| = 0 \quad (3)$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} |x| = 0 = |0| \quad \text{d'après (1), (2) et (3)}$$

d'où la fonction $x \mapsto |x|$ est continue en 0.

Conclusion : la fonction valeur absolue est continue sur $\mathbb{R}$.

Prouvons que la fonction valeur absolue n'est pas dérivable en 0.

$$\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ x < 0}} \frac{|x| - |0|}{x - 0} = \lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ x < 0}} \frac{|x|}{x} = \lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ x < 0}} \frac{-x}{x} = \lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ x < 0}} -1 = -1$$

$$\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ x > 0}} \frac{|x| - |0|}{x - 0} = \lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ x > 0}} \frac{|x|}{x} = \lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ x > 0}} \frac{x}{x} = \lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ x > 0}} 1 = 1$$

$$\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ x < 0}} \frac{|x| - |0|}{x - 0} \neq \lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ x > 0}} \frac{|x| - |0|}{x - 0}$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{|x| - |0|}{x - 0} \text{ n'existe pas}$$

Conclusion : la fonction valeur absolue n'est pas dérivable en 0.